



Zorgproces			
Wie	Wanneer (signalering en aanbieden zorg)	Zorgverlener	Actie
Vrouw 30+-40	Na bevalling; In elk geval na 2 ^e kind, 6 weken na controle Uitvragen na 6 weken Bij uitstrijkje	-verloskundige -doktersassistent	-evt. doorsturen naar Bekkenfysiotherapie -aanvullend onderzoek door huisarts, mogelijk echo - vragenlijst 3IQ test invullen; 1. afspraak maken bij HA 2. advies en folder meegeven
Vrouw 40+	Klachten bij hardlopen, springen, maar ook bij tillen etc. in ADL Bij uitstrijkje	-bekken- fysiotherapeut -doktersassistent	-doelgroep bereiken door voorlichting aan groepen. -informereren en motiveren; ook gericht op lange termijn effect/gevolgen. -Vragenlijst 3IQ test invullen; 1. afspraak maken bij HA 2. advies en folder meegeven
Vrouw 50-60+	Naast klachten van de menopauze Vrouwen met chronisch aandoening (DM) bij controle. Bij uitstrijkje	-huisarts -poh - doktersassistent	-menopauze consult bij apotheek - vragenlijst 3IQ test invullen; 1. afspraak maken bij HA 2. advies en folder meegeven
Vrouw 65+	Bij klachten van Multi problematiek Retentie problematiek	-WV -huisarts	-risico-signalering uitvragen (lijst Livio) -echo
Man	Nadruppelen Medicatie van uroloog	-huisarts -apotheek	-Folder toevoegen bij medicatie van uroloog